

Así se recortan los setos



Para poder obtener la **forma deseada**, las **plantas jóvenes** deben recortarse. El **brote principal** deberá quedar **intacto** hasta que la planta alcance la altura deseada. Los demás brotes se cortan **por la mitad**. Para evitar **calvas** en las **ramas inferiores** se debería cortar el seto en forma **trapezoidal**. Si desea conseguir **líneas rectas** le recomendamos utilizar cordeles tensados.

Es indispensable un mantenimiento regular. Si el seto se deforma lo mejor es aplicar un **corte a fondo**. Pero tenga cuidado porque hay algunos arbustos, como las coníferas, que son especialmente sensibles a esta **poda a fondo** en sus ramas antiguas.

Los arbustos que florecen en verano y el alibustre se deben podar **en invierno**, durante el descanso de la vegetación. A primeros de **Agosto** se hará una **nueva poda**. Se deben respetar estas fechas para no perjudicar a los pájaros en su incubación. **Los arbustos perennes o de aguja** hay que podarlos en **primavera**, justo antes de su brote, o todavía en otoño. Se deberán recortar un poco **los brotes nuevos** y todos los brotes antiguos que se pueda para estimular su crecimiento. **Así conseguirá un seto espeso que le protegerá de las miradas de los curiosos**.

Si aparecen **calvas** en los setos, el remedio más apropiado es **una buena poda**. Sin embargo tenga en cuenta que no todos los arbustos reaccionan igual a esta "**cura de rejuvenecimiento**".

El ojaranzo, el haya común, los arbustos frondosos perennes y los tejos disponen de una **gran capacidad de regeneración**. Sin embargo, otros **arbustos de aguja** se regeneran muy poco ó nada.